


ตัวให้เป็นอย่างไร ตัวให้กับตัวกระจก โผล่หน้าร้ายแรงกว่า



ตัวให้คือภาวะที่ลูกตาเมื่อความดันภายในลูกตาสูงเกินไป ทำให้ตาแข็งคล้ายหิน จึงเรียกตัวให้ความดันในลูกตาที่สูง ทำให้มีการเสื่อมของประสาทตา โรคตัวให้แบบไม่บ่อยเท่าตัวกระจก แต่บางครั้งร้ายแรงกว่า เมื่อออกจากก้ามรักษาหรือรักษาซ้ำจะทำให้ตาบอดหรือมัวมาก และรักษาให้กลับมาเห็นเดือนปีไม่ได้ด้วย



ต้อหินคือภาวะที่ตามีความดันลูกตาสูงเกินไป บางครั้งสูงมากจนตาแข็งเหมือนหิน จึงเป็นที่มาของชื่อต้อหิน โรคต้อหินพบไม่บ่อยเท่าต้อกระจกแต่น่าจะร้ายแรงกว่า เนื่องจากถ้าไม่รักษาหรือรักษาช้าจะทำให้ตาบอดหรือมัวมาก และรักษาให้กลับมาเห็นได้ชัดขึ้นไม่ได้ด้วย ขณะที่ต้อกระจกในผู้ใหญ่แม้เป็นมากแล้ว แต่พอผ่านตัดเมื่อได้ตาก็มักจะกลับมาเมื่อองค์เห็นได้ดี

ต้อหินคือโรคของตาชนิดหนึ่ง ที่มีการเลื่อมของประสาทตา ทำให้มีลานสายตาแคบลง มีตาบอดเนื่องตาบอดได้ เชื่อว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดต้อหิน ปัจจัยหนึ่งคือความดันตาที่สูงเกินไป ทำให้เกิดการกดที่เซลล์ประสาทตา เป็นผลให้มีประสาทตาเลื่อมตามมา ปกติตาคนเราจะมีการล้างน้ำหล่อเลี้ยงขึ้นภายในลูกตาตลอดเวลา และน้ำหล่อเลี้ยงตาเนื้อร้ายจะออกจากตาตลอดเวลา เช่นกันในปริมาณเท่ากับที่สร้างขึ้น เมื่อได้ก็ตามที่สมดุลนี้เสียไป คือมีการระบายออกน้อยกว่าสร้าง จะทำให้มีการคั่งของน้ำในลูกตา จึงมีความดันลูกตาสูงมากเกินไปตามมา เกิดภาวะต้อหินขึ้นได้




รูปการมองเห็นของคนปกติ



รูปการมองเห็นของคนเป็นต้อหินจะมีลานสายตาแคบลง

ต้อหินเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่พบในผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต้อหินแบ่งง่ายๆ ได้เป็น 2 ชนิด คือชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ดังนี้

1. ต้อหินชนิดเฉียบพลัน จะมีความดันลูกตาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลาเป็นวัน ทำให้มีอาการปวดตามาก ตาแดง ตาบวม อาจมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อเจียนร่วมด้วย ถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยเร็วจะทำให้สายตามัวลงอย่างรวดเร็วจนถึงตาบอดได้



รูปต้อหินเฉียบพลัน ทำให้ตาแดง ปวดตา

2. ต้อหินชนิดเรื้อรัง ความดันลูกตาจะสูงขึ้นช้าๆ ในเวลาเป็นเดือนเป็นปี ดังนั้นาจะมีเวลาปรับตัวได้ จึงอาจไม่มีอาการปวดตา ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวว่าเป็นต้อหินอยู่ จึงยังไม่ได้รับการรักษา ประสาทตาจะเสื่อมลงเรื่อยๆ นานสายตาจะแคบลงมากขึ้นๆ จนผู้ป่วยลังเกตว่าตามัวลง จึงมาพบแพทย์เมื่อโรคเป็นมากแล้ว ซึ่งการรักษาทั้งเพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาเสียไปมากกว่านี้ แต่ไม่สามารถช่วยให้ประสาทตาส่วนที่เสียไปแล้วคืนกลับมาได้ ดังนั้นความสำคัญของต้อหินชนิดนี้จึงอยู่ที่การคันพบร็อกตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้นในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีทุกคนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้



หรือผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน ควรไปรับการตรวจสุขภาพตาและวัดความดันตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สาเหตุของต้อหิน

- ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเอง
- ยอดยาประ不要太สเตียรอยด์เป็นประจำ
- มีการอักเสบเรื้อรังของลูกตา
- สาเหตุอื่นๆ เช่นอุบัติเหตุที่ตา, ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน



รูปภาพยอดยาประ不要太สเตียรอยด์ ที่มีขายในประเทศไทย

การรักษาต้อหินจะไม่สามารถทำให้เซลล์ประสาทตาที่เสียหายไปแล้วคืนกลับมาได้ แต่เป้าหมายของการรักษาคือไม่ให้สายตาเสียไปมากกว่านี้ ดังนั้นถ้ามีอาการปวดตาและโดยเฉพาะถ้ามีตาแดงร่วมด้วยให้รีบไปตรวจตา ส่วนผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน จะมีโอกาสเป็นต้อหินได้มากกว่าคนทั่วไป

ในปัจจุบันการรักษาต้อหินจะเพื่อให้ความดันลูกตาลดลง โดยการทำให้การสร้างน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาลดลง หรือทำให้การระบายน้ำออกจาลูกตาดีขึ้น หรือทั้งสองอย่าง การรักษาจะแบ่งเป็น 3 วิธี คือ

1. ยั่งดความดันตา มีทั้งชนิดรับประทาน และยาหยดตา
2. การยิงแสงเลเซอร์
3. การผ่าตัด

การจะรักษาโดยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินและผลของการรักษาในขณะนั้น โดยมีการประเมินและการตัดสินใจร่วมกันของลักษณะแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยโรคต้อหินจะต้องไปติดตามการรักษาตามนัด และใช้ยาตามที่จักษุแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหิน ซึ่งจะไม่สามารถทำให้กลับมาเห็นได้อีกเลย

ปัจจัยบ่งชี้ในการป้องกันตาบอดจากโรคต้อหิน

1. เมื่อมีอาการผิดปกติกับตา ห้ามซื้อยาหยดตามาหยดเอง เพราะถ้าได้ยาหยดตาประ不要太สเตียรอยด์ อาจทำให้เกิดโรคต้อหิน ทำให้ตาบอดได้
2. ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีทุกคนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหิน, ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นต้อหินเพิ่มขึ้น เช่น เป็นโรคเบาหวาน รับประทานยาสเตียรอยด์เป็นประจำ ควรไปรับการตรวจสุขภาพตาและวัดความดันตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ถ้ามีอาการผิดปกติทางตา เช่น ปวดตามากร่วมกับอาการตาบอด หรือรู้สึกตึงๆตา ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตั้งแต่ต้น

