

ลูกตา||และ ตั้ง||ต่าเกิด

ก่อหน้าตาอุดตันแต่กำเปิด พบได้ประมาณ 15% ของเด็กเกิดใหม่ เด็กจะมีหน้าตาคลอหรือเป็นขี้ต้าในตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ตา ตรวจโดยการกดเบาๆ บริเวณหัวตาข้างจมูก จะมีของเหลวเหนียวอาจเป็นหนองออกมากทางรูบาน้ำตาบริเวณใกล้หัวตา สามารถรักษาให้หายได้โดยง่าย ด้วยการนวดถุงน้ำตาบริเวณหัวตา แต่ถ้าปวดพอดีหรือไม่ได้นวดรักษาตั้งแต่เล็ก อาจต้องพารักษาปัญหาลูกตาและ ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกต้องถูกรังเกียจว่าเป็นขี้ต้ากรอะกรังหรือต้องดมยาสลบແยงก่อนหน้าตา ต้องตั้งใจรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง






เด็กที่มีน้ำตาคลอข้างเดียวหรือทั้งสองตาตั้งแต่เกิดอาจเป็นได้จากท่อน้ำตาอุดตันตั้งแต่เกิด ต้อหินตั้งแต่เกิด กระจากตาดำหรือเยื่อบุตาขาวมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ หรือมีการระคายเคืองจากสารเคมี เด็กปักธงจะเริ่มมีการสร้างน้ำตาเมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห์ไปแล้ว ดังนั้นแม้เด็กจะมีท่อน้ำตาอุดตัน เด็กมักจะเริ่มมีปัญหาน้ำตาไหลเมื่ออายุประมาณ 3 สัปดาห์ไปแล้ว เช่นกัน จะออกล่าในรายละเอียดของแต่ละโรคที่เป็นสาเหตุลูกตาและ ดังต่อไปนี้



1) ท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิด พบร้อยละประมาณ 15% ของเด็กเกิดใหม่ เกิดจากการอุดตันของท่อน้ำตา (ตำแหน่งอุดตัน อยู่บริเวณใกล้ปัลป์สายเปิดในจมูก) มักเริ่มมีอาการเมื่ออายุ > 3 สัปดาห์ เนื่องจากเริ่มมีการสร้างน้ำตา เด็กจะมีอาการตาแดงหรือน้ำตาไหลหรือเป็นขี้ตาตลอดเวลา หรือเป็นๆ หายๆ โดยเด็กจะไม่ร้องอ้างเหมือนมีขี้ตาจากการภาวะเยื่อบุตาอักเสบ และไม่มีตาขาว เป็นลีเดงเหมือนกรณีมีขี้ตาจากการเป็นโรคตาแดง การตรวจทำโดยการกดเบาๆ บริเวณหัวตา ข้างจมูก จะมีของเหลวหนืดขาวอาจเป็นหนองออกมากทางรูน้ำตาบริเวณใกล้หัวตา ภาวะนี้มักหายเองภายในอายุ 6 เดือน - 1 ปี แต่ยังอาจมีการในช่วงที่เด็กเป็นหวัด ดังนั้นในเด็กที่หายจากปัญหาท่อน้ำตาตันแล้ว ยังคงนวดหัวตาต่อ และหลีกเลี่ยงการเป็นหวัด ซึ่งจะทำให้อาการกลับมาเป็นอีก



รูปตัวขาวแสดงปลายห่อน้ำตา (nasolacrimal duct) ที่อุดตันในจมูก (จาก www.cerebromente.org.br)



ข้อเสนอแนะในการให้การดูแลรักษา

อายุ < 1 ขวบ : แนะนำนวดหัวตาโดยการนวดคลึงบริเวณหัวตา แล้วไล่ลงมาถึงด้านข้างจมูก (Creigler maneuver) วันละหลายๆ ครั้ง (เช่นวันละ 4 รอบ รอบละ 20 ครั้ง) และพิจารณาให้ยาปฏิชีวะ เช่น Tobrex® eyedrop หยดตาวันละ 1-4 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน (ช่วงมีไข้ตามากควรหยดตาวันละ 4 ครั้ง ส่วนช่วงไม่มีไข้ต้องให้หยุดวันละครั้งก่อนนอน)



รูปการนวดหัวตา เพื่อรักษาห่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิด



การนวดมีความสำคัญมาก เพราะยาหยดเป็นเพียงการป้องกันชั่วคราว แต่ต้องนวดให้เด็กอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่เด็กมักยอมให้นวดคือขณะกินนมหรือนอนหลับ จะทำให้การนวดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

อายุ > 1 ขวบ : แนะนำพบจักษุแพทย์ เมื่ออายุมากกว่า 1 ขวบ และนวดหัวตาแล้วไม่หาย อาจต้องทำการดมยา слับเพื่อแยงห่อน้ำตา (probing) ให้ท่อน้ำตาหายอุดตัน

2) เยื่อบุตาอักเสบ หรือโรคตาแดง อาจเป็นได้บ่อยในเด็กเล็ก เพราะภูมิคุ้มกันยังอ่อนแอ ถ้าเด็กหรือคนเลี้ยงใช้มือที่ไม่สะอาดถูกตาเด็ก อาจทำให้มีตาแดง มีน้ำตาและขี้ตาสีเขียวเหลืองได้ แต่เด็กมักร้องโวยัง เพราะเคืองตา ต่างจากการนี้เป็นเชื้อตากจากห่อน้ำตาอุดตัน ซึ่งเยื่อตาขาวมักไม่แดง และเด็กไม่ร้องโวยมากกว่าปกติ การรักษากรณีเป็นโรคตาแดง ควรพาไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะมาหยดตา

3) โรคต้อหินแต่กำเนิด จะมีลักษณะที่สำคัญคือตาข้างที่เป็นจะมีน้ำตาไหล ตาไม่สู้แสง และเด็กบีบตา นอกจากนี้ในเด็กบางคนที่เป็นมาก จะมีกระจุกตาตามข้างที่เป็นใหญ่กว่าปกติและอาจเป็นฝ้าขาวร่วมด้วย ต้องรีบพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่เนิ่นๆ การรักษาประกอบด้วยการผ่าตัดและการใช้ยาหยดตาลดความดันตา

4) กระจุกตาดำหรือเยื่อบุตาขาวมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ทำให้ระคายเคืองตา ถ้าลงสิ่งมีสิ่งแปลกปลอมในตาเด็ก ต้องพบแพทย์เพื่อให้การรักษาโดยเอาสิ่งแปลกปลอมออก และให้ยาหยดตาตามแต่ลักษณะของอาการ

