




นอกจากนี้ สาเหตุของโรคหนังตาตกในผู้ใหญ่อาจเกิดจากภาวะระบบประสาทที่ผิดปกติภาวะเนื้องอกที่บริเวณเปลือกตาภาวะการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อหรืออุบัติเหตุบริเวณเปลือกตาเช่นเดียวกับที่พบในผู้ป่วยเด็กเช่นเดียวกัน

**แนวทางการรักษา**

ส่วนใหญ่จะรักษาโดยการผ่าตัดหากอาการหนังตาตกเป็นมากจนบังการมองเห็น หรือ ต้องการประโยชน์ด้านความสวยงาม ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการผ่าตัดมีหลายวิธีขึ้นกับความรุนแรงของอาการ โดยภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดนั้นคล้ายคลึงกับในผู้ป่วยเด็ก ได้แก่ อาจเกิดการติดเชื้อของแผลผ่าตัดทำให้แผลอักเสบ แผลแยกได้ ภาวะกระจกตาแห้ง กระจกตาอักเสบติดเชื้อ ดังนั้นการพิจารณาการผ่าตัดจะต้องคำนึงถึงข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น



ศูนย์ตาธรรมศาสตร์  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
โทรศัพท์ 02-926-9999

# โรคหนังตาตก

## ในเด็กและผู้ใหญ่



### โรคหนังตาตก

โรคหนังตาตกคืออาการที่หนังตาบนตกลงมาคลุมตา โดยอาการหนังตาตกอาจเป็นเพียงเล็กน้อยไปจนถึงเป็นมากจนทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้



## โรคหนังตาตกในเด็ก



### โรคหนังตาตก

ในปัจจุบันสามารถพบอาการหนังตาตกได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยสาเหตุในการเกิด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการรักษาในผู้ป่วยแต่ละวัยนั้นแตกต่างกัน



สาเหตุของหนังตาตกที่พบในเด็กส่วนมากเกิดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณเปลือกตาด้านบนผิดปกติ พบอาการตั้งแต่กำเนิดอาจมีอาการตาขึ้นได้เอง นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ซึ่งอาจมีอาการที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้าง ได้แก่ โรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อตา เนื่องจากระบบประสาท โรคทางระบบประสาทโดยผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการหนังตาตก ซึ่งแพทย์อาจพบอาการอื่นๆทางระบบประสาทร่วมด้วย อีกทั้งในกลุ่มการอักเสบที่บริเวณเปลือกตาที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือมีอุบัติเหตุที่กระทบบริเวณเปลือกตา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้

- ❖ การมองเห็นที่ผิดปกติ
- ❖ ผู้ป่วยอาจบุคลิกภาพที่ผิดปกติ เช่น การ แหงนหน้าเวลามองตลอดเวลา
- ❖ ภาวะตาเข
- ❖ ภาวะสายตาสั้นในเด็ก

### แนวทางการรักษา

รักษาตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหนังตาตกนั้นๆโดยจะประเมินตามอาการ, อายุ, ภาวะแทรกซ้อนในขณะนั้นของผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการรักษาโรคหนังตาตกตั้งแต่กำเนิดมีดังนี้

- ❖ รักษาโดยการไม่ผ่าตัดใช้ในกรณีอาการเป็นไม่มาก เนื่องจากอาการดีขึ้นได้เอง โดยใช้การสังเกตอาการการปิดตา การวัดเว้าช่วย
- ❖ รักษาโดยการผ่าตัดหากอาการเป็นมากจนบังการมองเห็นหรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้น จะต้องใช้การรักษาโดยการผ่าตัด โดยการเย็บกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาไว้กับกล้ามเนื้อบริเวณคิ้ว

## โรคหนังตาตกผู้ใหญ่



สาเหตุของโรคหนังตาตกในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่โดยเกิดจากเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาด้านบนผิดปกติ โคนสาเหตุสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่างเช่น อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาด้านบนอ่อนแอลง การผ่าตัดตาหรือเปลือกตา การขยับเปลือกตาด้านบนและเป็นระยะเวลานาน